非瘟感染6到10天猪群表现：这些关键症状千万不能忽视

非洲猪瘟进入猪场后，最让人揪心的就是第6天到第10天这个阶段。很多养殖户发现，前四五天往往看不出什么异常，甚至有的猪还在正常吃料，但一到第六天左右，情况就迅速恶化了。这个时间段正是病毒在猪体内大量复制、免疫系统开始全面崩溃的爆发窗口，弄清楚它的真实表现，能帮你抢下黄金处理时间。

高烧不退和“扎堆”现象

感染非瘟的猪在第六天左右，体温会明显升高到40.5°C以上，甚至达到42°C。这时候你用手背摸耳朵、腹部或者大腿内侧，能明显感到发烫。最直观的表现是，即使天气不冷，猪也会挤在一起，因为它们觉得冷。这种“扎堆”和冬天保暖那种松散抱团不一样，是整栏猪往角落里压，身体紧贴在一起，精神明显萎靡。有些猪会趴在饮水器边不愿动，即便驱赶起来，走两步又趴下了。

采食下降和呕吐腹泻的节奏变化

到第7天到第8天，采食量断崖式下降是典型信号。有的猪突然一口都不吃，有的只是象征性啃几口。这时候你投料进去，会发现剩料明显增多。伴随而来的还有呕吐，吐出来的是黄白色的黏液，有时混着血丝。腹泻也开始出现，初期是灰白色稀粪，慢慢转为水样，带血或者呈沥青一样的黑色。这种腹泻不像普通胃肠炎那样拉几天就缓解，而是持续恶化，猪很快就显得消瘦、脱水。

皮肤出血点和耳朵发紫的识别要点

第9天到第10天左右，体表症状开始变得明显。最早出现的是耳朵、腹部、四肢内侧的针尖样出血点，摁下去不褪色。和普通应激引起的红斑不同，非瘟的出血点更密集，而且会逐渐扩大成紫斑。耳朵发紫是一个关键信号，有的猪是耳朵边缘先发紫，慢慢整片耳朵变成深紫色，摸上去冰凉，这是因为血液循环已经出现了严重障碍。如果这时候看到猪的屁股、尾巴尖也开始发紫，说明病情已经进入晚期。

呼吸急促与共济失调的高危信号

进入这个阶段后，有些猪会出现呼吸急促，频率能达到每分钟60次以上，张嘴喘气，嘴角流沫。这不是普通的呼吸道感染，而是肺部已经出现了严重充血水肿。更让人担心的是神经系统症状，有的猪站不稳，走路摇摇晃晃，像喝醉了一样；有的在原地打转，或者四肢划水一样乱蹬。出现这种情况，往往意味着病毒已经突破了血脑屏障，死亡率极高。

误判与处理的关键提醒

很多养殖户容易犯的一个错误是，看到发热、呕吐、腹泻就按传染性胃肠炎或者蓝耳病用药，结果用了三四天完全没有好转，反而死得更快。非瘟的发病节奏比任何普通猪病都要快，从出现症状到死亡，快的时候48小时以内。如果你发现猪群中陆续出现上述症状，并且相邻栏的猪也开始出现类似表现，就要高度警惕了。另外，不要随意给病猪打针退烧，尤其是氨基比林类，只会暂时压体温，而且打针造成的应激可能导致病毒扩散更快。

这个阶段能做的事，主要是早发现、早隔离、早采样送检。把有症状的猪单独圈起来，换专用靴子和工具，不要共用针头。同时观察周围栏位的猪有没有异样，一旦确认，必须严格按处置流程操作，拖

一天就是巨大的代价。